



DES SURFACES À PÂTURER EN PLUS POUR LES BREBIS

Des brebis dans les vignes

Un partenariat gagnant pour l'éleveur

> La valeur alimentaire du couvert végétal

La valeur alimentaire du couvert végétal des inter-rangs est équivalente à celles de jeunes pousses de printemps et d'automne

Une ressource alimentaire de très bonne qualité

(en kg de matière sèche)	UFL	PDIN	PDIE
Herbe en inter rang	0,96	109 g	99 g

Source : Chambre d'agriculture Dordogne/EPLEFPA de Monbazillac (24) - 2019.

> Cuivre : un faux problème ?

- Des taux de cuivre dans l'herbe pâturée qui peuvent être jusqu'à 9 fois supérieurs au seuil de toxicité
- Et pourtant, peu d'intoxications observées,
- Présence de soufre, molybdène et fer qui réduisent la sensibilité
- Des études en cours sur cette question

> Les brebis n'abîment rien

- Elles consomment essentiellement le couvert jusqu'aux tours des pieds des vignes
- Elles mangent quelques feuilles mortes sur les branches et le reste des rafles
- Elles passent facilement sous les fils d'un rang à l'autre



Parole d'éleveur

« J'économise du foin depuis qu'une partie du troupeau pâture les vignes du château. »

Partenaires techniques



Soutiens



Financé par



Avec la contribution financière du Compte d'Affectation Spéciale « Développement Agricole et Rural »