



Des brebis dans les couverts !

Des avantages pour les 2 ateliers

Le pâturage des couverts par les brebis permet de :

- ➔ Allonger la période de pâturage et donc favoriser l'autonomie fourragère
- ➔ Limiter les risques parasitaires (système dominé par les cultures annuelles)
- ➔ Améliorer la qualité du sol et le rendement de la culture suivante (N facilement disponible via les déjections)



Le rendement des couverts est très variable suivant les années car dépendant de la pluviométrie estivale.





Une ressource fourragère de bonne qualité

Valeur alimentaire équivalente à celle de repousses d'herbe d'automne (environ 0,9 UFL et 90g de PDI/kg de MS).

- Les couverts se pâturent sans transition alimentaire particulière ni rationnement en choisissant des espèces adaptées.
- L'apport de concentré ou de fourrage n'est pas nécessaire.
- Cette ressource est adaptée à toutes les catégories d'animaux. Il est possible de finir des agneaux jeunes élevés à l'herbe sur des couverts en automne et début d'hiver (la finition nécessite 35 j supplémentaires pour atteindre un même poids carcasse).

Quelles espèces choisir pour mes couverts ?

| Espèces à éviter  | Espèces à privilégier  |
|---|---|
| Luzerne, trèfle violet, trèfle blanc (météorisants) Moutarde (richesse en glucosinolates : risque de toxicité) | Avoine, féverole, pois fourrager, vesce, radis fourrager, navet, trèfle d'alexandrie ou trèfle incarnat, colza fourrager, phacélie, millet, moha, ... |