

La chronique ovine

Le pâturage toute l'année est compatible avec le bien-être des brebis

Les résultats d'une récente étude¹ réalisée en zones céréalières montrent que les brebis peuvent pâturer à toutes les saisons tout en assurant de bonnes performances zootechniques et en étant sereines. En effet, avec une ressource alimentaire suffisante, les mères et les agneaux sont en bonne santé quelle que soit la saison. Bien que leur toison soit mouillée en conditions pluvieuses, la peau des animaux reste sèche : la laine joue son rôle d'imperméable. En hiver, 50% des agneaux présentaient une laine mouillée à l'extérieur de la toison mais la peau sèche était sèche dans tous les cas. D'autre part, aucun problème respiratoire n'a été observé, en été comme en hiver.

Boiteries à surveiller

Quelques problèmes d'échauffements entre les onglons pouvant apparaître en conditions pluvieuses, il est nécessaire de surveiller les boiteries et de les soigner rapidement. Enfin, les observations au pâturage montrent des animaux paisibles et exprimant leurs comportements naturels. Ils pâturent, ruminent, se déplacent, sans expression de nervosité ou de mal-être. Les brebis restent cependant vigilantes aux perturbations inhabituelles. Pour en savoir plus, un film d'animation est à votre disposition sur ciirpo.idele.fr : « *des brebis sereines au pâturage à toutes les saisons* ».

¹ projet Sobriété piloté par Bio Centre et financé par le conseil régional du Centre-Val de Loire et l'Union Européenne



Photo semaine 21-24

Légende : Aucune différence n'a été mise en évidence entre les deux races observées, Berrichon de l'Indre et Romane, si ce n'est que la première se disperse sur l'ensemble de la parcelle, tandis que la seconde est plus grégaire.

CP : C Maitre (INRAE)

Equipe technique ovine de Bourgogne-Franche-Comté et Laurence Sagot (Institut de l'Elevage/CIIRPO)

Les activités du CIIRPO sont financées par l'Union Européenne et les conseils régionaux Nouvelle-Aquitaine et Région Centre-Val de Loire