


Reprise de végétation délicate.

Les fortes températures de la semaine dernière n'ont rien arrangé à la pousse de l'herbe, avec des croissances toujours très variables, voire nulles selon les secteurs. Reste à savoir comment cela va évoluer avec l'arrivée de l'automne, des températures de saison et quelques précipitations toujours insuffisantes ? En situation plus favorable, priorité à la valorisation de l'herbe ou des dérobées dans la ration de base pour économiser les stocks.



Repères conduite du troupeau : du 17 au 24 septembre 2018

	39 Foin	39 Ensilage	25-90 Foin	25-90 Ensilage	70 Foin / Enrubannage	70 Ensilage
Lait moyen / vache traite (kg)	21,3	22,3	22,6	22,4	17,9	22,4
TB Moyen (g/kg)	36,8	39,6	37,2	40,4	38,1	38,2
TP Moyen (g/kg)	32,9	33,3	32,8	32,7	32,5	32,6
Valorisation ration de base (kg)	10,8	9,2	13,3	11,9	8,6	9,8
Coût HFPE (€ / 1000 kg lait)	66,2	83,0	56,2	73,1	63,8	74,9
g de concentrés / kg de lait	230	283	194	218	219	253

Point de vue de l'éleveur : Daniel PAULIEN - EARL Les Denaises à BATTRANS (70)


Les conditions météo très critiques de l'année ne permettent pas d'assumer l'autonomie fourragère du cheptel laitier. Depuis juillet, 14 mm d'eau seulement pour faire lever les derniers semis de maïs. Le troupeau de 55 vaches pâture sur 16 ha découpés en 5 parcelles, où l'herbe est inexistante. Il faut donc compter sur la 1ère coupe d'herbe de l'année, ainsi que la luzerne qui est la seule à pousser cette année. Les méteils ensilés au printemps sont aussi les bienvenus pour nourrir les vaches.

Les génisses quant à elles sont au foin depuis début Août. En bio les rations d'hiver sont coûteuses et le manque de stock est inquiétant pour faire face à cette sécheresse.


Propos recueillis par Valérie SIBLOT, conseillère à Haute-Saône Conseil Élevage.

Groupe Herbe Franche-Comté

Courbe de croissance de l'herbe en plaine



Courbe de croissance de l'herbe sur les plateaux



Courbe de croissance de l'herbe en montagne

