


31 Calendrier fourrager



Agro – Météo

Station météo	Altitude (m)	Cumul pluvio depuis le 1er janvier (mm)	Degrés cumulés depuis le 1 ^{er} février
Avrée	302	263	1232
Chateau-Chinon	598	281	1105
Clamecy	215	167	1207
Dun les Places	598	293	1044
Lormes	485	228	1192
Luzy	300	244	1198
Montigny en Morvan	285	219	1157
Nevers	175	211	1213
Prémery	260	234	1168

Situation météo au 30 Mai 2022 d'après données MétéoFrance

La semaine passée, malgré des nuits et des débuts de matinée frais puis des après-midi nuageux avec vent du nord, a vu la barre des 1200°C franchie pour la majorité des stations (en moyenne sur la semaine 100°C cumulés). Les récoltes en foin ont déjà bien commencé.

A l'image des orages de dimanche soir, la répartition des pluies a été très hétérogène sur le département. Le déficit de pluviométrie s'est accentué dans les zones déjà mal pourvues en précipitation. Espérons que les pluies annoncées les prochains jours soient mieux réparties.

■ Gestion mécanique des adventices et des refus, c'est le moment...

Comment gérer les adventices :

Le rumex,

c'est une plante vivace très robuste. Elle forme plusieurs tiges et peut atteindre des hauteurs de 50 à 120 cm.

Il s'installe préférentiellement sur des sols riches en azote, frais et bien drainés. A fort pouvoir de régénération, la racine forme une couronne de rhizomes dont l'épaisseur et le nombre augmentent avec l'âge de la plante.

C'est par la graine que se propage le rumex, couper, exporter et brûler les hampes est indiqué. Suivant le niveau d'infestation, il faudra faire varier la stratégie : « la fauche les épuse ».

Le chardon,

Contrairement au rumex, le chardon des champs, vivace à drageons, se multiplie essentiellement par multiplication végétative, par tâches qui s'élargissent. Ses racines sont porteuses de réserves et d'organes végétatifs.

En cas de forte invasion et en localisé, pour en venir à bout, le déchaumage est efficace par épuisement des réserves à condition de multiplier les passages espacés de 10 à 30 jours. Il faut bannir le chisel, les outils à dents droites et la herse rotative. Un travail superficiel est suffisant.

Autrement, les fauches répétées épuisent le chardon (3 ou 4/an), intervenir quand le chardon atteint 15 à 20 cm de haut et avant la floraison.

Les chardons fauchés à la floraison sont capables de produire des semences viables.

Agir trop tôt au stade «rosette» favorise le réveil des bourgeons dormants.

⚠ Un morceau de rhizome de 1 cm peut redonner une plante



Faucher les refus:

La fauche des refus permet d'éliminer les faibles quantités de fourrages qui ont réussi à épier. Au passage suivant, les repousses de ces plantes seront plus tendres et donc consommées par les animaux. C'est également une mesure sanitaire destinée à diminuer les possibilités de survie de parasites dans les refus. La fauche des refus doit être réalisée le plus rapidement possible après la sortie des animaux du paddock. Le matériel utilisé pour la fauche ou le broyage des refus doit couper le fourrage de manière la plus nette possible et en brins assez fins (1 à 2 cm) afin de faciliter leur répartition et leur décomposition. La hauteur de coupe doit être d'environ 6-7 cm.

La fauche des refus ne doit pas servir de "cache-misère".

En effet, la fauche systématique est souvent le résultat d'une mauvaise gestion du pâturage. Broyer une quantité importante de refus, c'est aussi laisser une masse de fourrage en décomposition qui risque de jouer le rôle de répulsif au prochain passage des animaux et avoir un effet dépressif sur le couvert.