



Point Fourrages


Conseil collectif à destination des éleveurs de la Nièvre

12/06/2019

N°17



Calendrier fourrager



Agro – Météo

La semaine dernière a été ponctuée d'averses empêchant la poursuite des récoltes. Ces pluies et la baisse des températures ont permis la reprise de la pousse dans les pâtures (environ 100 kg de MS/ha/jour), interrompue par les fortes chaleurs de début juin.

Les animaux disposent encore de quelques jours d'avance au pâturage. Les prairies fauchées tôt sont également bien réparties et pourront bientôt être exploitées à nouveau (pâturage dans les prairies permanentes afin d'allonger le rythme de rotation des animaux en pâturage tournant, deuxième coupe dans les prairies temporaires type ray grass-trèfle ou luzerne-dactyle). Les prairies de fauche qui n'ont pas été déprimées fleurissent dans la plupart des secteurs du département.

La reprise des récoltes ne devrait pas être possible avant le début de la semaine prochaine avec des fourrages qui s'annoncent de qualité moyenne : un foin récolté au stade floraison des graminées présente une teneur en énergie inférieure en moyenne de 0,2 Ufl par rapport à un fourrage récolté au stade début épiaison ainsi qu'un déficit de 4 points de MAT.

Station météo	Altitude (m)	Cumul pluvio semaine passée (mm)	Cumul pluvio depuis le 1er janvier (mm)	Degrés cumulés depuis le 1 ^{er} février
Avrée	302	10,4	290	1274
Château-Chinon	598	16,4	457,3	1396
Clamecy	215	11,8	222,8	1288
Dun les Places	598	14	388	1172
Lormes	485	14,9	409	1296
Nevers	175	19,5	266,9	1280
Prémery	260	13,4	309	1268

Données météo au 9 juin 2019 (Source : Météo France)



Foin : ne pas faucher trop ras

- Les fauches trop rases épuisent les plantes, pénalisant le redémarrage de la végétation et la pérennité de la prairie → **ne pas faucher en dessous de 7 cm**

Les conseillers de la Chambre d'Agriculture seront présents lors de la demi-journée de démonstration de matériel de fenaison organisée par les établissements Malecot-Poirier le 19 juin à Choungny pour parler du lien entre récolte et valeur alimentaire des fourrages.

Prairies semées à l'automne sous couvert de MCPI : premiers résultats encourageants

- Les conditions particulières de la fin d'été 2018 ont empêché de nombreux semis de prairies. Une solution d'adaptation a été de semer les prairies en automne, sous couvert d'un MCPI (mélange de céréales et de protéagineux récoltés immatures), celui-ci assurant la protection de la jeune prairie durant l'hiver et une production fourragère conséquente en première coupe.



18 jours après l'ensilage du MCPI, la prairie a bien redémarré et l'ensemble des espèces semées sont présentes (photos ci-dessus). Une exploitation de celle-ci sera possible en cours d'été (fauche ou pâture selon les besoins).



Des conseillers élevage à votre service

Tél : 03 86 93 40 60

Mail : elevage@nievre.chambagri.fr

